香港陳炳忠博士治療胰腺癌的臨證經驗

劉碧鳳

（香港註冊中醫學會）

陳炳忠博士是多年來活躍在澳洲、香港兩地的著名中醫治癌專家，有40多年的臨床實際經驗。陳博士原為中國貴陽中醫學院內科教研室副主任，從事臨床、教學、科研等工作，後在澳洲墨爾本大學醫學院獲得醫學博士學位（1993年），並在墨爾本大學醫學院從事臨床醫學研究，也是墨爾本皇家理工大學中醫部創始主任。2000年受聘為香港大學助理教授，次年底升任副教授，2007年退休，繼續在香港中環診所治療癌症患者，療效顯著，許多經西醫治療無效的晚期癌症患者，經陳教授診治後，大有轉機，充份顯示中醫治癌的優勢，達到癌瘤消退或帶瘤生存的卓效。

【關鍵詞】胰腺癌　中醫藥治療　名醫經驗

陳炳忠

癌症是當今危害人類健康和生命的最主要疾病，也是醫學界公認的第一大研究難題。在所有癌症中，胰腺癌是最具有生命威脅性，根據WHO發佈的統計資料，即使在診斷和治療條件較好的歐洲，胰腺

香港註冊中醫學會版權所有 Copyright HKRCM ALL Rights Reserved

癌的5年生存率也只有4%，是包括肝癌、肺癌、腦癌等在內的所有40多種癌病中生存率最低的[1]。英國專家在臨床研究調查中進一步指出：胰腺癌即使有手術機會者，術後平均生存期也僅14個月；若只能作姑息手術者，則平均生存期僅5個月，所有胰腺癌病例的一年生存期不到10%，罕有能生存5年者[2]。陳炳忠博士10多年來應用中醫藥治療33例胰腺癌，療效遠超過前者，其中1例未能切除癌塊，亦未作放化療者，僅作中藥治療存活9年，死於其它原因。1例有肝轉移手術切除胰腺癌塊和肝轉移癌但未作放化療者，中醫藥治療已逾6年；1例胰體癌肝轉移未手術亦未化療放療者，中醫藥治療存活近5年。從陳博士治療33例胰腺癌的病案資料中[3]，提示中醫藥治療有令人鼓舞的效果。本人受香港中醫雜誌編輯部的委托，特給予整理推介，以饗同道。

1　在診治中注意辨證與辨病相結合

胰腺癌是西醫病名，據國內學者統計，華人中以40-70歲為多發年齡，胰頭與頸部是癌腫多發部位，約佔70-80%，其餘發生於胰體及胰尾部，也有彌漫性或全胰腺癌[4]。陳炳忠博士指出：位於胰頭的癌由於解剖關係，可引起胆總管狹窄而出現阻塞性黃疸。所以，臨證中胰頭癌出現黃疸病徵較突出，約90%病例有黃疸，這種黃疸可能呈無痛性，且進行性加重。胰頭癌實驗室檢查可見鹼性磷酸酶升高，提示胆道系統阻塞。穀草轉氨酶、穀丙轉氨酶等升高提示肝功能損害。胰體和胰尾部的癌腫，起病較隱襲，發現時癌塊常已較大。陳炳忠博

香港註冊中醫學會 版權所有 Copyright HKCM All Rights Reserved

士治療的33例胰腺癌患者中，男性13例，年齡43~77，平均61歲；女性20例，年齡30~87，平均61歲。胰頭癌19例，胰頭胰體癌2例，胰體癌5例，胰尾癌4例，胰體胰尾癌3例。病理細胞學檢查方面，大多為腺癌，另有惡性程度大的肉瘤（high grade sarcoma）1例，神經內分泌瘤3例。上述病例中醫辨證多為濕熱氣滯，痰瘀互結和氣血虛弱型。常見臨床表現有黃疸，皮膚癢，腹脹，腹痛，消瘦，疲乏，舌紅紫，苔黃膩，脈細滑或細弱或弦細。有的病人有上腹部腫塊和不規則發熱。個別病例證屬氣陰兩虛，痰瘀互結，表現疲勞氣短，面色蒼白，口乾便秘，上腹腫塊，舌淡苔白膩，脈細弱等[3]。陳教授在辨證施治中，強調注意與辨病相結合，分析本病的病理變化及生化指標，選用經現代藥理學研究，有抗癌作用的中藥，常可提高療效。例如根據美國加州大學外科系研究[6]：石見穿、大黃、知母、艾葉、沒藥、王不留行和鈎籐等中藥對胰腺癌有較好的抗癌作用。以色列特拉維夫大學醫學院的研究證明[7]：薑黃與環氧化酶-2抑制劑celecoxib在抑制胰腺癌方面有協同作用，認為薑黃與celecoxib合併使用，可增強抗癌療效，並可減少celecoxib的用量，從而減輕其毒副作用。美國霍普國立醫學中心腫瘤外科的Schwarz等用流式細胞儀和TUNEL法檢測：研究發現中藥復方SPES殺滅胰腺癌細胞的作用比阿黴素強[8]。PC-SPES由以下8種成分組成（DiPaola et al., 1998; Hsieh et al., 1998; Darzynkiewicz et al., 2000）： Dendrantherma morifolium Tzvel(菊花), Ganoderma lucidium Karst(靈芝), Glycyrrhiza glabra L.（甘草），Isatis indigotica Fort（大青葉），Panax pseudoginseng

Copyright ©1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

Wall（參三七），Rabdosia rubescens Hart（冬淩草），Scutellaria baicalensis Georgi（黃芩），Serenoa repens Small（鋸葉棕）[9-10]。

2　在治療中堅持把扶正祛邪貫徹始終

癌症是正虛邪實的疾病。所謂正虛，包括臟腑功能減退和陰陽氣血虛衰等不同情況；所謂邪實，則有氣滯血瘀，痰濕凝聚，或熱毒蘊結之異。前人曰:「壯人無積，虛則有之」，「積聚者臟腑之病也，…虛勞之人，陰陽傷損，血氣凝澀，不能宣通經絡，故積聚於內也」，「積之成也，正氣不足，而後邪氣踞之」。因此，陳炳忠博士強調：中醫治療癌症的總原則是扶正祛邪。無論癌病在早期或晚期，均應扶正祛邪，攻補兼施。並非早期以攻為主，晚期以補為主，因為扶正與祛邪是相輔相成的。若正氣不扶，引至正氣虛弱，則難以祛邪，癌瘤會發展、擴散；若邪毒不祛，則難以扶正，癌瘤會不斷耗損氣血，使正氣日虛，出現惡病質。臨床實踐證明，「扶正祛邪，攻補兼施」是治癌成功的關鍵[5]。在扶正方面，視個體情況不同分別予以益氣，補血，養陰或溫陽等。常用藥物有党參，生白朮，黃芪，淮山藥，西洋參，當歸，丹參，百合，麥冬，生地，女貞子，枸杞，鱉甲，龜板，天花粉、續斷，淮牛膝，仙靈脾等。這些中藥經現代藥理學研究，大多有增強免疫功能的作用[3]；在祛邪方面，則針對不同情況，分別予以活血化瘀，清熱解毒，化痰利濕，軟堅散結，以毒攻毒等。常用藥物有：清熱解毒類：白花蛇舌草、半邊蓮、敗醬草、半枝蓮、龍葵、蚤休、蒲公英等；活血化瘀類：薑黃、莪朮、三棱、丹參、桃仁、大

Copyright IKCM. All Rights Reserved

黃、王不留行、延胡索、郁金等；化痰散結軟堅類：瓜蔞、貝母、南星、半夏、杏仁、百部、海蛤殼、牡蠣、海藻等；利水滲濕類：豬苓、澤瀉、防己、土茯苓、薏麥、生苡仁等；蟲類攻毒藥：蟾皮、蜈蚣、蜂房、全蠍、土鱉蟲等。據現代研究表明，上述藥物一般都具有抗癌作用[3]。扶正與祛邪是兩種性質不同的治療原則，但兩者相互為用，相輔相成。臨床實踐表明，中醫藥治療大多能延長癌病患者的生存期和改善其生活質素，甚至有時使癌病患者得到根治[4]。陳教授在扶正祛邪中強調：在治療癌症患者中，應用扶正藥要守而不變，祛邪藥要有計劃輪換使用。根據陳教授在澳洲的中西醫互補臨證經驗，體會到西醫治癌通常不用單一化療藥，而選用聯合化療，有利於提高療效和防止癌細胞形成耐藥性。基於同樣的道理，陳教授亦主張中藥抗癌藥聯用法，攻邪藥物組應當每1~2個月輪換一次，不要總是用同一組抗癌中藥；而扶正藥，則應較長時間守而不變。陳博士應用此原則，並注意對症治療，對改善胰腺癌患者的生活質素也很重要。胰腺癌常見的對症用藥：納呆可用白朮、神曲、炒麥芽、山楂等；腹痛可用玄胡，木香，白芍和炙甘草等；退黃可選用綿茵陳、金錢草、山梔、黃芩等；胰腺癌黃疸常為痰瘀互結，配用杏仁、橘紅、澤蘭有助退黃；改善肝功能可用蒲公英；發熱常可用青蒿、柴胡、黃芩等。腹部腫塊或胰腺癌塊未能切除者，可加製鱉甲軟堅散結。陳博士應用上法治療癌症患者，療效卓著[3]。

3　重視與堅持長期性治療

香港註冊中醫學會版權所有 Copyright © HKCM. All Rights Reserved

癌病容易復發的原因是癌細胞難以被完全殺滅，成為復發的根源。陳教授在40多年中醫臨證，20多年西醫臨床實踐中，體會到許多癌症患者經中藥治療均取得良好療效和較長期的穩定，但都在停用中藥後病情惡化。根據陳教授的33例胰腺癌患者醫案，18例堅持中醫治療。其中1例未能切除癌塊，亦未作放化療者，中藥治療已生存超過7年以上。1例有肝轉移兩次手術切除胰腺癌塊和肝轉移癌但未作放化療者，中醫藥治療已2年半；1例胰體癌肝轉移未手術亦未化療放療者，中醫藥治療已2年。還有另外5例亦仍在治療中。有10例已去世，其中8例合併有西醫治療。這10例的生存期4~33個月，平均13.9個月，中位數13個月，超過一年生存期者達60%。另有15例僅僅就診1次或數次，未堅持中醫治療。以下是三例生存期較長患者的病案。

病例一，司徒先生，男，77歲，2001年9月因出現進行性加深的無痛性黃疸約一個月伴體重減輕20磅及疲乏而就診。查血清總胆紅質達100μmol/L，鹼性磷酸酶（ALP）856U/L，穀丙轉氨酶（ALT）120U/L，穀草轉氨酶（AST）104U/L，丙種醯轉肽酶（GGT）994U/L，CA19.9 323U/ml。經超聲波、CT和內窺鏡逆行胰胆管造影（ERCP）診斷為胰頭癌（圖1）。患者未能手術切除，拒絕化療，僅放置支架引流胆汁。於2001年10月開始單純中藥治療。當時消瘦，體重僅95磅，鞏膜輕黃染，有不規則畏寒發熱，食納少，疲乏無力，口乾苦，大便每日1~2次，舌淡紫，苔微黃膩，脈弦滑。辨證屬濕熱氣滯，痰瘀互結和氣血虛弱。初診方用柴胡，黃芩，當歸，党參，白朮，茯苓，佛手，郁金，莪朮，綿茵陳，生苡仁，豬苓，土茯苓，仙鶴草，敗醬

香港註冊中醫學會版權所有 Copyright HKRCM All Rights Reserved

草，白花蛇舌草。以後按抗癌、扶正、辨證對症治療原則加減，約一個月後，黃疸消退，肝功能恢復正常，精神明顯改善。2001年11月21日CT復查顯示胰頭癌塊無擴大。患者繼續中藥治療。2002年1月14日再次CT復查已見不到胰頭癌塊。體重增加，精神、食欲良好。患者仍斷斷續續服中藥，至2010年9月4日因其它原因去世，存活9年。

病例二，鄺某，女，30歲。2005年10月出現黃疸，腹瀉，貧血，血總胆紅質278，肝功能差，經CT診斷胰頭癌（圖2），11月首次手術，病理報告神經內分泌癌。2006年再手術切除肝轉移癌。無化療放療。2006年2月22日初診，當時面色蒼白，消瘦，體重91磅，日瀉5~6次，其中夜間腹瀉4次。疲勞，每日腹痛難忍，ALP199U/L，ALT60U/L，AST41U/L。現中藥已治療逾2年半，體重增為110磅，面色紅潤，精神佳，大便日2次，夜間無需大便。腹痛止，肝功能正常，至今仍在治療中，存活已逾6年。

病例三，江某，女，2006年3月經CT發現胰體癌並有多發肝轉移（圖3），活檢證實為神經內分泌癌。同年8月24日就診時尚未手術，亦未化療和放療。當時消瘦，疲勞，便秘，無黃疸和腹痛。舌淡紫，苔黃，脈略細弱。辨證為氣血虛弱，痰瘀互結和兼夾濕熱，按抗癌、扶正、辨證對症治療原則處理，中醫治療近3年，一般狀況良好，後患者稱獲悉神經內分泌癌發展慢，乃自停中藥達1年多，情況逐漸惡化，於2011年元旦去世，存活近5年。其實，所謂胰腺神經內分泌癌發展慢只是比較胰腺的腺癌而言，但仍然比乳腺癌、結腸癌、鼻咽癌的5年生存率低，因此不可疏忽治療。此例患者若不中斷中醫治療，

香港註冊中醫學會版權所有 Copyright HKRCM All Rights Reserved

有可能生存更長時間。

陳炳忠博士應用中藥治療33例胰腺癌中，堅持中醫藥治療的18例，其中有1例未能切除癌塊，亦未作放化療者，中藥治療存活9年。1例有肝轉移手術切除胰腺癌塊和肝轉移癌但未作放化療者，中醫藥治療已逾6年；1例胰體癌肝轉移未手術亦未化療放療者，中醫藥治療存活近5年。另有5例目前亦在治療中。10例去世者，其中8例合併有西醫治療。這10例的生存期4~33個月，平均13.9個月，中位數13個月。超過一年生存期者達60%。這些資料提示中醫治療有令人鼓舞的效果。值得重視和進一步研究。

香港註冊中醫學會 版權所有 Copyright HKRCM All Rights Reserved

參考文獻

[1] F. Berrino, et al., Survival of cancer patients in Europe: the EUROCARE-2 study. WHO International Agency for Research on Cancer, European Commission, 1999.

[2] C.R.W. Edwards, et al., Davidson's principles and practice of medicine, 17th ed. Churchill Livingstone 1995

[3] 陳炳忠. 胰腺癌33例的臨床表現和中醫藥治療. 香港中醫雜誌. 2008,3(4)：34-38.

[4] 李恩主編. 中國中西醫結合臨床全書. 中國古籍出版社, 2006：1764.

[5] 陳炳忠、田應芳. 中醫治療癌症的六點體會. 香港中醫雜誌, 2007：2(4)：38-41.

[6] Shoemaker M, et al., In vitro Anticancer Activity of Twelve Chinese Medicinal Herbs. Phytotherapy Research 2005 19:649-51

[7] 季宇彬主編.抗癌中藥藥理與應用，黑龍江科學技術出版社，1999

[8] Schwarz RE, Donohue CA, et al., Pancreatic cancer in vitro toxicity mediated by Chinese herbs SPES and PC-SPES: implications for monotherapy and combination treatment. Cancer Lett. 2003 Jan 10;189(1):59-68.

[9] DiPaola RS, Zhang H, et al., Clinical and biologic activity of an estrogenic herbal

combination (PC-SPES) in prostate cancer. N Engl J Med. 1998 Sep 17;339(12):785-91.
[10] Darzynkiewicz Z, Traganos F, et al., Chinese herbal mixture PC SPES in treatment of prostate cancer (review). Int J Oncol. 2000 Oct;17(4):729-36.

（編委：陳炳忠審校2012.03.21）

圖1. 例一，胰頭癌（1~2是2001年11月21日的CT掃描所見，3為2004年1月15日的掃描）

圖2. 例二，胰頭癌

圖3.例三，胰體癌肝轉移

香港註冊中醫學會 版權所有
Copyright HKRCMP All Rights Reserved